



Laxik

pre deti

ZDRAVOTNÍČKA POMÔCKA

Mikroklystír 3 g - Glycerol • Harmanček • Slez

Zloženie

Každá jednodávková nádoba s obsahom 3 g obsahuje glycerol 2,25 g; pšeničný škrob 0,02 g; harmančekový tekutý extrakt 0,10 g; extrakt slezovej tekutiny 0,10 g; čistenú vodu.

Mechanizmus pôsobenia

Uvoľňuje a lubrikuje stolicu a s upokojujúcim účinkom uľahčuje jej vylučovanie.

Kontraindikácie

Mikroklystír nepoužívať v prípade akútnej bolesti brucha alebo bolesti neznámeho pôvodu.

Vedľajšie účinky

U pacientov so zvláštnou citlivosťou na jednotlivé zložky alebo v prípade predchádzajúceho zápalu sliznice môže dôjsť k podráždeniu sliznice konečníka.

Dávkovanie

1 alebo 2 jednodávkové obaly s mikroklystírom počas 24 hodín.

Návod na použitie

Každá jednotlivá dávka prípravku LAXÍK zostáva až do okamihu použitia jednotlivito uzavretá, aby bola zaručená hygiena a praktickosť použitia. Na otvorenie dózy uchopte hrdlo a otočením viečka ho odstráňte. Pri manipulácii netlačte na pružné telo dózy, aby sa pred použitím nevyliat obsah produktu. Vhodné je kanylu namazať kvapkou roztoku pred jej zavedením do konečníka. Odstráňte kanylu a vyhodte ju.

Podmienky skladovania

Skladujte na chladnom a suchom mieste pri izbovej teplote, mimo zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia. Dátum expirácie uvedený na obale sa vzťahuje na produkt v neporušenom obale, dobre uchovaný. Uchovávať mimo dosahu detí.

Zoznam symbolov



Šarža



Nepoužívajte opakovane



Dátum expirácie



Prečítajte si návod na použitie



Uchovávať pri teplote medzi 4–30 °C



Neznečisťujte životné prostredie.
Po použití vyhodte do odpadkového koša.



Výrobca: New.Fa.Dem. Srl
Viale Ferrovie dello Stato,1 - Zona ASI
80014 Giugliano in Campania (Na) Italy

Distribútor pre SK: Otakar Horák - H - Kontipro s.r.o.,
Kragujevská 398/4, 010 01 Žilina | www.h-kontipro.sk



Laxik

pro děti

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

Mikroklystýr 3 g - Glycerol • Heřmánek • Sléz

Složení

každá jednodávková nádoba o obsahu 3 g obsahuje glycerol 2,25 g; pšeničný škrob 0,02 g; heřmánkový tekutý extrakt 0,10 g; extrakt slézové tekutiny 0,10 g; čistou vodu.

Princip účinku

Uvolňuje a promazává stolicí a se zklidňujícím účinkem usnadňuje její vylučování.

Kontraindikace

Mikroklystýr nepoužívat v případě akutní bolesti břicha nebo bolesti neznámého původu.

Vedlejší účinky

U pacientů se zvláštní citlivostí na jednotlivé složky nebo v případě předchozího zánětu sliznice může dojít k podráždění sliznice konečníku.

Dávkování

1 nebo 2 jednodávkové obaly s mikroklystýrem po dobu 24 hodin.

Návod k použití

každá jednotlivá dávka přípravku LAXÍK zůstává až do okamžiku použití jednotlivě uzavřena, aby byla zaručena hygiena a praktičnost použití. Pro otevření dózy uchopte hrdlo a otočením víčka jej odstraňte. Při manipulaci netlačte na pružné tělo dózy, aby se před použitím nevyllil obsah produktu. Vhodné je kanylu namazat kapkou roztoku před jejím zavedením do konečníku. Odstraňte kanylu a vyhoďte ji.

Podmínky skladování

Skladujte na chladném a suchém místě při pokojové teplotě, mimo zdroj tepla a přímého slunečního záření. Datum expirace uvedené na obalu se vztahuje na produkt v neporušeném obalu, dobře uchovaný. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Seznam symbolů



Šarže



Nepoužívejte opakovaně



Datum expirace



Přečtěte si návod k použití



Uchovávejte při teplotě mezi 4–30 °C



Neznečišťujte životní prostředí.
Po použití vyhoďte do odpadkového koše



Výrobce: New.Fa.Dem. Srl
Viale Ferrovie dello Stato,1 - Zona ASI
80014 Giugliano in Campania (Na) Italy

Distributor pro ČR:

Beaufy s.r.o., U Trati 886/52, 100 00 Praha 10 | www.beaufy.eu